



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске
ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692864
тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail: partizansk@pkrrn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

27.07.2023г. № 1010

Главе администрации
Лазовского муниципального округа
Ю.А. Мосальскому

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске с целью информирования населения Лазовского муниципального округа по вопросам профилактики клещевого энцефалита,

предлагаю:

- разместить информацию в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления и статью в газете «Синегорье» на тему: «Что делать и куда обращаться, если вы не вакцинированы против клещевого энцефалита и произошло присасывание клеща?»

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Партизанске

И.А. Прокофьева

Быкова Т. Б.
8/42363/ 6-33-38

Что делать и куда обращаться, если вы не вакцинированы против клещевого энцефалита и произошло присасывание клеща?

Если укусил клещ- это значит, что паразит въедается в кожные покровы с помощью гипостомы (специальный вырост на голове). Таким образом, клещ присасывается к телу человека достаточно крепко, удерживаясь продолжительное время на ее поверхности или под кожей. Слюна клеща имеет анестезирующие свойства, поэтому человек не ощущает укуса клеща. Совместно со слюной в организм поступают патогенные микроорганизмы, быстро распространяющиеся по кровяному руслу.

В большинстве случаев присасывание клеща человек замечает во время принятия душа или ванны – в виде небольшой темной точки. Но иногда, паразитические виды могут спровоцировать ряд неприятных симптомов:

- гиперемированный участок овальной формы
- зуд в месте укуса
- повышение температуры тела до 38-39 градусов
- слабость в мышцах, озноб
- безразличие и безучастие к происходящему вокруг
- болезненная чувствительность глаз к свету
- усталость, сонливость.

Для тех, кто принял решение о вакцинации только сейчас, при наличии показаний, первичная вакцинация проводится по схеме экстренной профилактики с интервалом 2-3 недели.

В целях профилактики присасывания клещей необходимо проводить само-взаимоосмотры с целью снятия наползающих клещей. При посещении лесных массивов необходимо надевать защитную одежду светлых тонов, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и рукава. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Рубашку необходимо заправлять в брюки, концы брюк в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Необходимо также применять репелленты (отпугивающие средства), которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Для обработки одежды используют средства, отпугивающие клещей, например, «Гардекс», «ДЭТА», «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный» и другие. Перед использованием препаратов следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, для этого надо обратиться в хирургический кабинет (с 8-00 до 15-00) или в приемное отделение (круглосуточно) КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница». Чем раньше снят присосавшийся клещ, тем меньше вероятность попадания возбудителя клещевых инфекций в рану.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию «ЮНИЛАБ» г. Партизанск, тел 8(4236) 36-50-59, где проводят экспресс диагностику для определения его зараженности. При получении положительного результата на исследованного клеща, пострадавшему необходимо обратиться в медицинскую организацию для назначения экстренной профилактики.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА



КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

- В лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках
- При заносе клещей собаками, кошками или людьми – на одежду, с цветами
- При употреблении в пищу сырого молока и продуктов, приготовленных из него
- При раздавливании клеша или расчесывании места укуса

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ



Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ



КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

ПО ВОЗМОЖНОСТИ СРАЗУ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ



Снятого клеща доставляют на исследование
в микробиологическую лабораторию



Подробнее на
www.rosпотребнадзор.ru